

WERSJA 2 - pytanie 4 i odpowiedniki w innych wersjach

U pacjenta z AZS objawem rozwinięcia chłoniaka może być erythrodermia (nie dodatni wywiad rodzinny). Prawidłową odpowiedzią jest erythrodermia.

WERSJA 2 pytanie 7

U 24-letniego mężczyzny wystąpiły na skórze tułowia rozlane plamy o kolorze różowym i brązowym z otrębiastym złuszczeniem, cechujące się fluorescencją w świetle lampy Wooda. Niezależnie od tego że u różnych pacjentów fluorescencja ma odcień ciemniejszy lub jaśniejszy (dlatego podano dwie nazwy koloru), to obraz kliniczny wskazuje, że nie jest to trądzik

WERSJA 3 Pytanie 58

Najczęstszym typem czerniaka jest czerniak szerzący się powierzchownie (70% czerniaków). Do tego pytania nie mogą być dwie prawidłowe odpowiedzi

WERSJA 3

Pytanie 74

Każda infekcja może być czynnikiem indukującym liszaj płaski błon śluzowych, jednak u pacjentów z LP prawdopodobieństwo infekcji HCV jest znacznie wyższe niż w ogólnej populacji. Prawidłowa odpowiedź HCV

WERSJA 3

Pytanie 10

Postać obrączkowata nie istnieje w oficjalnych klasyfikacjach postaci klinicznych BCC (pełna lista postaci jest w podręczniku i prezentacji). Niekiedy układ zmian obrączkowaty może być w postaci guzkowej lub powierzchownej, ale nie jest to postać/odmiana kliniczna. To była nieprawidłowa odpowiedź

WERSJA 1

pytanie 97

Neutrofilowy naciek zapalny występuje w wielu jednostkach chorobowych i nie stanowi cechy charakterystycznej wyłącznie dla piodermii zgorzelinowej.

Ta odpowiedź była nieprawidłowa.

WERSJA 4

pytania 31

Opisany przypadek dotyczy grzybicy strzygącej skóry owłosionej głowy. Wynik badania w lampie Wooda jest negatywny.

Wersja 3

Pyt 32

Jedyną prawidłową odpowiedzią w tym pytaniu jest cyklopiroksolamina.

Można również zastosować inne leki w tym ketokonazol, klotrimazol, ekonazol i inne, ale to nie było przedmiotem pytania